

# Perspiblock Deo Roll-on 50 ml



Preis: 11,06 €

## Beschreibung im Wörterbuch

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Einheitspreis    | 50 ml     |
| Form             | Deodorant |
| Inhalt           | 50 ml     |
| Kategorie        | Kosmetik  |
| Marke Hersteller | AFLOFARM  |
| Versand          | in 24h    |

## Produktbeschreibung

**Zusammensetzung** Wasser, Aluminiumchlorhydrat, Glycerin, Aluminiumlactat, Methylpropanediol, Phenoxethanol, Hydroxyethylcellulose, Zitronensäure und Silbercitrat, Allantoin, Ethylhexylglycerin. **Wirkung** Die Wirkstoffe sorgen für eine effektive Reduzierung der übermäßigen Schweißproduktion. Die bewährte antimikrobielle Wirkung der Inhaltsstoffe hilft, den unangenehmen Schweißgeruch zu beseitigen. Perspiblock Deo enthält Allantoin, das eine beruhigende Wirkung hat und Hautreizungen vorbeugt. Perspiblock ist ein geruchsneutrales Produkt, daher schließt es die Verwendung von parfümierten Kosmetika wie Eau de Toilette und Parfüms nicht aus. **Dosierung** Perspiblock Deo ist für die äußerliche Anwendung auf übermäßig schwitzenden Hautpartien wie Achselhöhlen, Händen und Füßen bestimmt. Nur auf sauberer, trockener und gesunder Haut anwenden. Nicht innerhalb von 48 Stunden nach der Enthaarung auftragen. Tragen Sie Perspiblock Deo in den ersten 2-5 Tagen jeden Abend vor dem Schlafengehen auf, bis die gewünschte Wirkung erreicht ist. Dann 1-2 Mal pro Woche oder so oft wie nötig auftragen, um die Transpirationsintensität unter Kontrolle zu halten. Nach der abendlichen Anwendung waschen Sie die Anwendungsstelle mit einer milden Seife und spülen sie morgens mit Wasser ab. Morgens nicht erneut auftragen. Um Reizungen zu vermeiden, wird empfohlen, am Tag nach der Anwendung keine anderen Deodorants oder Antitranspirantien zu verwenden. **Anti-Indikationen** Kontraindiziert bei Allergie gegen einen der Produktbestandteile. Nicht auf gereizter Haut anwenden. Falls an der Anwendungsstelle eine Reizung in Form von Brennen, Juckreiz oder Rötung auftritt, sollte das Produkt nicht weiter verwendet werden. Nach Abklingen der Symptome wieder verwenden.