

## ZIAJA Ibument Gel 50mg/g + 30mg/g 100 g



Preis: 5,59 €

## Beschreibung im Wörterbuch

Form	Gel
Inhalt	100 g
Kategorie	Arzneimittel
Marke Hersteller	ZIAJA
Versand	in 24h

## Produktbeschreibung

**ZIAJA Ibument Gel 50mg/g + 30mg/g 100 g** Dies ist ein Gel, das zwei Wirkstoffe enthält: Ibuprofen mit entzündungshemmender und schmerzstillender Wirkung und Levomenthol mit lokalanästhetischer Wirkung. Es ist für Kinder ab 12 Jahren und für Erwachsene bestimmt. **Dosierung** Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in der Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt oder Apotheker. Das Arzneimittel wird äußerlich auf die Haut aufgetragen. **Empfohlene Dosis** Erwachsene und Kinder über 12 Jahre: Tragen Sie das Gel auf die schmerzende Stelle auf und massieren Sie es sanft ein, bis das Arzneimittel eingezogen ist. Tragen Sie jeweils 1 bis 4 cm des Gels auf. Wiederholen Sie die Anwendung je nach Bedarf, bis zu maximal 3 Mal pro Tag. Tragen Sie das Gel nicht häufiger als alle 4 Stunden auf. Waschen Sie sich nach dem Auftragen des Gels die Hände, es sei denn, es handelt sich um die behandelte Stelle. Bedecken Sie die Stellen, auf die das Gel aufgetragen wurde, nicht mit Verbänden, wie z. B. Pflastern oder Verbänden. Die Höchstdauer der Behandlung beträgt zwei Wochen. Wenn nach 7 Tagen keine Besserung eingetreten ist oder sich der Patient schlechter fühlt, wenden Sie sich an Ihren Arzt. **Wirkung** Ibument Gel ist ein Arzneimittel mit entzündungshemmender und schmerzstillender Wirkung. Es übt eine kombinierte Wirkung der darin enthaltenen Wirkstoffe Ibuprofen und Levomenthol aus. Ibuprofen (ein nicht-steroidales entzündungshemmendes Arzneimittel), das durch Hemmung der Prostaglandinsynthese wirkt, hat schmerzlindernde und entzündungshemmende Eigenschaften. Gleichzeitig bewirkt das im Medikament enthaltene Levomenthol ein kühlendes Gefühl an der Applikationsstelle und hat eine leicht betäubende Wirkung. **Indikationen** Ibument ist ein Gel zur Behandlung von: Schmerzen und Schwellungen aufgrund von Verletzungen nach dem Training, Gelenkverletzungen mit Bänderriss (Gelenkverstauchungen), Sportverletzungen; rheumatischen Schmerzen, einschließlich Gelenkschmerzen aufgrund von entzündlichen und degenerativen Veränderungen; Rückenschmerzen, Hexenschuss, Muskelschmerzen, Schmerzen in faserigem Gewebe, Sehnen und Bändern. **Schwangerschaft und Stillzeit** Wenn Sie schwanger sind oder stillen, wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, sollten Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat fragen.