

Fypryst Combo 50 mg/60 mg Tropflösung für Katzen 1 Pipette



Preis: 4,07 €

Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	0,5 ml
Form	Liquid
Inhalt	0,5 ml
Kategorie	Tierbedarf
Marke Hersteller	KRKA
Versand	in 48h

Produktbeschreibung

Anwendung Es ist für die Behandlung und Vorbeugung von Floh-, Zecken- und Läusebefall bestimmt. **Wirkung** Verhindert die Flohvermehrung durch ovizide und larvizide Wirkung. Kann als Teil einer APZS-Behandlungsstrategie verwendet werden. **Zieltierarten** Katzen, Frettchen **Behandlungsindikationen bei Katzen** Das Produkt ist nur für die Bekämpfung von Flohbefall oder bei gemischtem Befall mit Zecken und/oder Läusen bestimmt. - Beseitigung von Flöhen (*Ctenocephalides* spp.). Die insektizide Wirkung gegen einen Neubefall mit erwachsenen Flöhen hält 4 Wochen lang an. Das Produkt verhindert die Vermehrung der Flöhe, indem es die Entwicklung ihrer Eier (ovizide Wirkung) sowie der Larven und Puppen (larvizide Wirkung) aus den von den erwachsenen Flöhen abgelegten Eiern hemmt. Diese Wirkung hält für einen Zeitraum von 6 Wochen nach der Verabreichung an. - Beseitigung von Zecken (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Wie aus experimentellen Daten hervorgeht, hält die milbentötende Wirkung des Produkts bis zu 2 Wochen nach der Anwendung an. - Beseitigung von Läusen (*Felicala subrostratus*). Das Produkt kann als Teil einer Behandlungsstrategie für allergische Flohdermatitis (APZS) verwendet werden, wenn es zuvor von einem Tierarzt diagnostiziert wurde. **Behandlungsindikationen bei Frettchen** Das Produkt ist nur zur Bekämpfung von Flohbefall oder bei gemischtem Befall mit Zecken bestimmt. - Beseitigung von Flöhen (*Ctenocephalides* spp.). Die insektizide Wirkung gegen einen Neubefall mit erwachsenen Flöhen hält 4 Wochen lang an. Das Produkt verhindert die Vermehrung der Flöhe, indem es die Entwicklung ihrer Eier (ovizide Wirkung) sowie der Larven und Puppen (larvizide Wirkung) aus den von den erwachsenen Flöhen abgelegten Eiern hemmt. - Beseitigung von Zecken (*Ixodes ricinus*). Wie experimentelle Daten zeigen, hält die milbentötende Wirkung des Produkts 4 Wochen nach der Verabreichung an. **Kontraindikationen** Aus Mangel an verfügbaren Daten sollte das Produkt nicht bei Jungtieren unter 8 Wochen und/oder mit einem Gewicht von weniger als 1 kg verwendet werden. Das Produkt nicht bei Frettchen unter 6 Monaten verwenden. Das Produkt nicht bei kranken Tieren (mit allgemeiner Krankheit, Fieber) oder bei Tieren in der Rekonvaleszenz anwenden. Das Produkt nicht bei Kaninchen anwenden, da die Gefahr von Nebenwirkungen und sogar des Todes besteht. Aufgrund des Fehlens geeigneter Studien wird das Produkt nicht für die Anwendung bei Nicht-Zielarten empfohlen. **Dosierung für Katzen** Eine 0,5 ml Pipette pro Katze topisch auf die Haut geben, was einer empfohlenen Mindestdosis von 5 mg/kg Fipronil und 6 mg/kg (S)-Methopren (durch Tupfen) entspricht. **Dosierung für Frettchen** Eine Pipette mit 0,5 ml pro Frettchen topisch auf die Haut auftragen, was einer Dosis von 50 mg Fipronil und 60 mg (S)-Methopren pro Frettchen (durch Tupfen) entspricht. **Verabreichungsweise** 1. Nehmen Sie die Einzeldosis-Pipette aus der Verpackung. Halten Sie die Pipette aufrecht, schrauben Sie die Spitze ab und entfernen Sie sie. 2. Drehen Sie die Spitze um und setzen Sie das andere Ende auf die Pipette. Drücken und drehen Sie die Spitze, um die Versiegelung zu durchstoßen, und nehmen Sie sie dann von der Pipette

ab. 3. Tragen Sie das Produkt auf die Haut am Halsansatz vor den Schulterblättern auf. 4. Bürsten Sie die Haare des Tieres weg, so dass die Haut sichtbar ist. Setzen Sie das Ende der Pipette auf die Haut und drücken Sie mehrmals, um den Inhalt in einem Bereich direkt auf die Haut zu drücken. **Empfehlungen für die richtige Anwendung** Der Mindestabstand zwischen den Behandlungen beträgt 4 Wochen.