DERMOeco PUH MAJ
OPATOWSKA 10, STASZOW PL
+48 153 000 066

Loratan pro 10 mg 10 Kapseln

Preis:5,97 €

Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	10 ct
Form	Kapseln
Inhalt	10 Kapseln
Kategorie	Medikamente
Lieferung	in 2-4 werktagen
Marke Hersteller	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Produktbeschreibung

Charakteristika Loratan pro ist ein antiallergisches Medikament, das keine Schläfrigkeit verursacht. Das Medikament wird bei Heuschnupfen und idiopathischer Urtikaria eingesetzt. Loratan pro wird angewendet bei: symptomen einer allergischen Rhinosinusitis (wie Niesen, wässriger Nasenausfluss, Nasenjucken, Gaumenjucken, Juckreiz und brennende und tränende Augen), chronischer idiopathischer Urtikaria (wie Juckreiz und Rötung der Haut, begleitet von typischen Hautveränderungen). **Wirkung** Bei einer allergischen Reaktion werden verschiedene Stoffe (so genannte Mediatoren) freigesetzt, die Allergiesymptome hervorrufen. Einer dieser Stoffe ist Histamin. Das Medikament Loratan pro verhindert die Wirkung von Histamin und wirkt somit antiallergisch. Loratan pro lindert die durch Histamin verursachten Symptome einer allergischen Reaktion: Juckreiz, Rötung, Schwellung und Nasenausfluss. In der empfohlenen Dosierung hat das Medikament bei den meisten Menschen keine sedierende Wirkung. **Dosierung** Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in der Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Das Arzneimittel kann unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden. Die Kapsel ist unzerkaut zu schlucken. Die übliche Dosis beträgt: Erwachsene und Kinder über 12 Jahre - 1 Kapsel (10 mg) einmal täglich. Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren mit einem Gewicht von mehr als 30 kg - 1 Kapsel (10 mg) einmal täglich. Kapseln (10 mg) sind bei Kindern mit einem Gewicht von weniger als 30 kg nicht angezeigt. Die Behandlung mit Loratadin ohne ärztlichen Rat sollte 10 Tage nicht überschreiten. Bei Patienten mit schwerer Leberinsuffizienz sollte eine niedrigere Anfangsdosis verwendet werden, da die Clearance von Loratadin bei diesen Patienten verringert sein kann. In solchen Fällen sollten bei Erwachsenen und Kindern mit einem Körpergewicht von mehr als 30 kg 10 mg Loratadin (1 Kapsel) jeden zweiten Tag verabreicht werden. Konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Einnahme des Arzneimittels.