DERMOeco PUH MAJ
OPATOWSKA 10, STASZOW PL
+48 153 000 066

Ibuprom 200 mg 10 Tabletten

Preis:2,97 €

Beschreibung im Wörterbuch

Form	Tabletten
Inhalt	10 Tabletten
Kategorie	Arzneimittel
Marke Hersteller	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Indikationen Schmerzen verschiedenen Ursprungs von leichter bis mäßiger Intensität, einschließlich: Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Muskelschmerzen, Schmerzen im Lendenwirbelbereich, Knochen- und Gelenkschmerzen; schmerzhafte Menstruation; Fieber (auch bei Grippe, Erkältung oder anderen Infektionskrankheiten). **Dosierung** Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren (Körpergewicht 20-29 kg): zur Kurzzeitbehandlung 1 Tablette oral alle 6-8 Stunden nach den Mahlzeiten. Verwenden Sie nicht mehr als 3 Tabletten pro Tag (maximale Tagesdosis 600 mg in geteilten Dosen) Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren (Körpergewicht 30-39 kg): bei Kurzzeitbehandlung 1 Tablette oral alle 6 Stunden nach den Mahlzeiten. Nehmen Sie nicht mehr als 4 Tabletten pro Tag ein (Tageshöchstdosis 800 mg in geteilten Dosen) Erwachsene und Kinder über 12 Jahre: bei Kurzzeitbehandlung 1 bis 2 Tabletten oral alle 4 Stunden nach den Mahlzeiten. Verwenden Sie nicht mehr als 6 Tabletten pro Tag (maximale Tagesdosis von 1200 mg in geteilten Dosen). Ein Abstand von mindestens 4-6 Stunden zwischen aufeinander folgenden Dosen sollte eingehalten werden. Erhöhen Sie die empfohlene Dosis nicht. **Zusammensetzung** 1 Tablette enthält: Wirkstoffe: 200mg Ibuprofen; Hilfsstoffe: Cellulosepulver, Maisstärke, gelierte Stärke, Guarkernmehl, Talkum, Crospovidon (Typ A), hydratisiertes kolloidales Siliciumdioxid, gehärtetes Pflanzenöl; Zusammensetzung der Hülle: Hydroxypropylcellulose, Macrogol 400, Talkum, Gelatine, Saccharose, Kaolin, Puderzucker (Mischung aus Saccharose und Maisstärke), Calciumcarbonat, Akaziengummi, Titandioxid (E 171), Opalux White AS 7000, Carnaubawachs, Opacode Black S-1-17823 schwarze Tinte. **Kontraindikationen** Überempfindlichkeit gegen Ibuprofen oder einen der Hilfsstoffe, gegen Acetylsalicylsäure oder ein anderes NSAID, aktive oder frühere peptische Ulkuskrankheit, hämorrhagische Diathese, schwere Leber- oder Niereninsuffizienz, schwere Herzinsuffizienz, Alter unter 6 Jahren. Alter, drittes Trimester der Schwangerschaft, gleichzeitige Einnahme anderer NSAIDs einschließlich COX-2-Hemmern.

.