

Acard 75 mg 60 magensaftresistente Tabletten



Preis: 4,14 €

Beschreibung im Wörterbuch

Form	Filmtabletten
Inhalt	60 Tabletten
Kategorie	Arzneimittel
Marke Hersteller	POLFA
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Indikationen Ischämische Herzkrankheit und jede klinische Situation, in der eine Thrombozytenaggregationshemmung indiziert ist
Vorbeugung von Myokardinfarkten bei Hochrisikopatienten; frischer Myokardinfarkt oder Verdacht auf frischen Myokardinfarkt; instabile Angina; Sekundärprävention bei Patienten nach Myokardinfarkt; Zustand nach koronarer Bypass-Transplantation, koronarer Angioplastie; Vorbeugung von transitorischer zerebraler Ischämie (TIA) und ischämischem Schlaganfall bei Patienten mit TIA; nach ischämischem Schlaganfall bei Patienten mit TIA; bei Patienten mit peripherer Arteriosklerose; Vorbeugung von Koronarthrombose bei Patienten mit multiplen Risikofaktoren; Vorbeugung von venöser Thrombose und Lungenembolie bei Patienten mit langfristiger Immobilisierung, z. B. Acard enterale Tabletten sind verkapselt und zerfallen nicht im Magen, wodurch die reizende Wirkung der Acetylsalicylsäure auf die Magenschleimhaut verringert wird. Die enteralen Tabletten sollten nach einer Mahlzeit eingenommen werden - unzerkaut schlucken. Hinweis: Bei frischem Myokardinfarkt oder Verdacht auf frischen Myokardinfarkt können enterale Tabletten verwendet werden, wenn Acetylsalicylsäure in Form von unbeschichteten Tabletten nicht verfügbar ist. In diesem Fall sollten die enteralen Tabletten sehr gründlich gekaut werden, um eine schnelle Resorption zu erreichen. Vorbeugung von Myokardinfarkten bei Hochrisikopersonen: In der Regel 1 enterale Tablette (75 mg) pro Tag. Frischer Myokardinfarkt oder Verdacht auf frischen Myokardinfarkt: 4 enterale Tabletten (300 mg) auf einmal. Die enteralen Tabletten sollten sehr gründlich gekaut werden, um eine schnelle Resorption zu erreichen! Instabile koronare Herzkrankheit, Sekundärprävention bei Patienten nach Myokardinfarkt: In der Regel 1 enterale Tablette (75 mg) pro Tag. Zustand nach koronarer Bypass-Transplantation, koronarer Angioplastie: In der Regel 1 enterale Tablette (75 mg) pro Tag. Vorbeugung von transitorischen zerebralen Ischämie-Anfällen (TIA) und ischämischen Schlaganfällen bei Patienten mit TIA (transitorischer ischämischer Schlaganfall). TIA - transitorische ischämische Attacken): In der Regel 1 enterale Tablette (75 mg) pro Tag. Nach ischämischem Schlaganfall bei Patienten mit TIA: 1 enterale Tablette (75 mg) pro Tag. Bei Patienten mit peripherer Arteriosklerose: In der Regel 1 enterale Tablette (75 mg) täglich. Vorbeugung von Koronarthrombosen bei Patienten mit mehreren Risikofaktoren: Empfohlene Tagesdosis 1 bis 2 Magen-Darm-Tabletten (75 mg bis 150 mg). Vorbeugung von Venenthrombosen und Lungenembolien bei Patienten mit längerer Ruhigstellung, z. B. nach größeren Operationen als Ergänzung zu anderen Prophylaxemaßnahmen: 1 bis 2 enterale Tabletten (75 mg bis 150 mg) pro Tag. **Zusammensetzung** Eine enterale Tablette enthält 75 mg Acetylsalicylsäure (Acidum acetylsalicylicum).