DERMOeco PUH MAJ
OPATOWSKA 10, STASZOW PL
+48 153 000 066

Aspirin Cardio 100 mg 28 Tabletten

Preis:3,01 €

Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	28 ct
Form	Filmtabletten
Inhalt	28 tabletten
Kategorie	Arzneimittel
Marke Hersteller	BAYER
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Indikationen Acetylsalicylsäure ist bei folgenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen indiziert - bei instabiler Angina pectoris, - bei frischem Myokardinfarkt oder Verdacht auf frischen Myokardinfarkt, - zur Vorbeugung eines erneuten Myokardinfarkts, - zur Vorbeugung thromboembolischer Komplikationen nach gefäßchirurgischen oder interventionellen Verfahren (z. B. Der Einsatz des kardiovaskulären Systems wird zur Vorbeugung thromboembolischer Komplikationen nach gefäßchirurgischen Eingriffen oder Interventionen (z. B. perkutane transluminale Koronarangioplastie (PTCA), Koronararterien-Bypass-Transplantation (CABG), Karotis-Endarteriektomie, arteriovenöser Shunt) empfohlen, - zur Vorbeugung von transitorischen ischämischen Attacken (TIA) und ischämischen Schlaganfällen bei Patienten mit TIA, Wirkstoff: Acidum acetylsalicylicum **Wirkstoff** 1 Filmtablette enthält 100 mg Acidum acetylsalicylicum (Acetylsalicylsäure) als Wirkstoff. **Dosierung** - bei instabiler Angina: 100 mg Acetylsalicylsäure einmal täglich. - bei frischem Myokardinfarkt oder bei Patienten mit Verdacht auf frischen Myokardinfarkt: initiale Sättigungsdosis von 200 - 300 mg Acetylsalicylsäure einmal täglich (2 bis 3 Tabletten), um eine schnelle Hemmung der Thrombozytenaggregation zu erreichen. Die Tabletten sollten gekaut werden, um eine schnelle Resorption zu gewährleisten. - zur Vorbeugung eines erneuten Myokardinfarkts: 100 mg Acetylsalicylsäure einmal täglich. - zur Vorbeugung von embolischen/thrombotischen Komplikationen nach chirurgischen oder interventionellen Gefäßverfahren (z. B. Zur Vorbeugung thromboembolischer Komplikationen nach gefäßchirurgischen Eingriffen oder Interventionen (z. B. perkutane transluminale Koronarangioplastie (PTCA), Koronararterien-Bypass-Grafting (CABG), Karotis-Endarteriektomie, arteriovenöser Shunt) - 100 mg Acetylsalicylsäure einmal täglich. - zur Vorbeugung von transitorischen ischämischen Attacken (TIA) und ischämischen Schlaganfällen bei Patienten mit TIA - 100 mg Acetylsalicylsäure einmal täglich. - zur Vorbeugung eines ersten Herzinfarkts bei Patienten mit multiplen Risikofaktoren - 100 mg Acetylsalicylsäure einmal täglich. - zur Vorbeugung von tiefen Venenthrombosen und Lungenembolien bei Patienten mit längerer Ruhigstellung, z.B. nach größeren Operationen als Ergänzung zu anderen Prophylaxemethoden - 100 mg bis 200 mg Acetylsalicylsäure einmal täglich.