

Alugastrin Max Protect 10 ml x 10 Beutel



Preis: 7,11 €

Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	100 ml
Form	orale Suspension
Inhalt	10 Säckchen
Kategorie	Medizinisches Gerät
Marke Hersteller	URGO SP.Z O.O.
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Merkmale Alugastrin Max Protect ist ein Medizinprodukt, dessen Inhaltsstoffe: Natriumalginat, Natriumbicarbonat, Natriumcarbonat und Kalziumcarbonat, mechanisch wirken. Das Produkt hat drei synergetische Wirkungen: Blockierung des sauren Refluxes, Verringerung des Sodbrennens und Schutz der Speiseröhrenschleimhaut. Es ist für die Behandlung von gastroösophagealen Refluxsymptomen wie Sodbrennen, Sodbrennen während der Schwangerschaft, Refluxösophagitis, Ansammlung von Mageninhalt in der Speiseröhre, Verdauungsstörungen, nächtliche Refluxsymptome, Husten, Kehlkopfentzündung und Pharyngitis angezeigt. **Wirkung** Alugastrin Max Protect enthält Natriumalginat und Natriumcarbonate, die einen physikalischen Wirkmechanismus aufweisen. Bei Kontakt mit dem sauren pH-Wert des Magens geliert Natriumalginat (ein natürliches Polymer, das aus braunen Algen gewonnen wird) und die Carbonate setzen Kohlendioxid frei, das die Gelpartikel an die Oberfläche des Mageninhalts transportiert und so ein "Floß" bildet. Dadurch wird die Passage des Mageninhalts in die Speiseröhre mechanisch blockiert. Darüber hinaus wird durch das Vorhandensein von Bikarbonat der Säuregehalt des Magens reduziert. Dank der oben genannten Eigenschaften bei gleichzeitiger mechanischer Barrierewirkung schützt das Produkt die Speiseröhrenschleimhaut vor der aggressiven Wirkung der Säuren. Dadurch fördert es die Regeneration und hilft, das Wiederauftreten der Refluxösophagitis zu verhindern. Die geeignete Formulierung aus Natriumalginat und Carbonaten sorgt für eine schnelle Wirkung. **Zusammensetzung** Gereinigtes Wasser, Natriumalginat, Natriumbicarbonat, Natriumcarbonat, Calciumcarbonat, Aroma, Polyacrylsäure, Natriumpropylparahydroxybenzoat, Natriummethylparahydroxybenzoat, Natriumsaccharinat.

Anwendungshinweise Erwachsene und Kinder über 12 Jahre: 1 oder 2 Beutel nach den Hauptmahlzeiten und vor dem Schlafengehen. Vor Gebrauch schütteln. Kinder unter 12 Jahren: nur nach Rücksprache mit dem Arzt verabreichen. Art der Verabreichung: streng nach den Anweisungen des Arztes.