

Olimp Hydratonic Med Himbeergeschmack 10 Portionsbeutel.



Preis: 7,40 €

Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	10 ct
Form	Pulver
Inhalt	10 Säckchen
Kategorie	Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke
Marke Hersteller	OLIMP
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Wirkung Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke. Enthält Zucker und Süßstoffe. Pulverförmige Formel, die nach dem Auflösen in Wasser als orale Rehydrationsflüssigkeit zur diätetischen Behandlung von Wasser-Elektrolyt-Störungen verwendet wird, bei denen die Gefahr einer Dehydrierung des Organismus während Durchfall und Erbrechen besteht. Es handelt sich um ein Rehydrationsprodukt mit reduzierter Osmolarität und reduziertem Natriumgehalt, dessen Zusammensetzung den Empfehlungen der ESPGHAN (Europäische Gesellschaft für pädiatrische Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung) entspricht. Für Kinder ab 3 Jahren, Jugendliche und Erwachsene zur diätetischen Behandlung von Dehydrierung bei Durchfall und/oder Erbrechen, zur Ergänzung von Flüssigkeit und Mineralstoffen. **Zutaten** wasserfreie Glukose, Maltodextrin, Natriumcitrat, Zitronensäure, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Aromen, Acesulfam K - Süßstoff. **Dosierung** Lösen Sie den Inhalt des Beutels in 200 ml warmem abgekochtem Wasser auf. Gekühlt servieren. Die Lösung sollte nicht gesüßt werden. PHASE DER HYDRATION (erste 3-4 Stunden der Hydratation) PHASE DER KONTINUIERLICHEN HYDRATION (weitere Phasen der Hydratation) Körpergewicht: 12 bis 15 kg 4 Beutel in 800 ml aufgelöst. Lösen Sie 1 Beutel in 200 ml auf. Nach jedem Durchfall oder Erbrechen 100 ml der zubereiteten Flüssigkeit verabreichen. Körpergewicht: über 15 kg 6 Beutel aufgelöst in 1200 ml. In kleinen Portionen verabreichen. **Hinweis** Das Produkt ist unter ärztlicher Aufsicht einzunehmen. Hergestellt ohne Milcheiweiß, Laktose und Gluten. Das Produkt sollte nicht verwendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit gegen einen seiner Bestandteile besteht. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosis des Präparats. Das Produkt ist ein unvollständiges Lebensmittel und sollte nicht als alleinige Nahrungsquelle verwendet werden. Nicht parenteral anwenden. Das Produkt ist kontraindiziert bei schlechter Nierenfunktion, hämodynamischem Schock und Darmverschluss.