


Rapacholin Forte HERBAPOL WROCLAW 30 Tabletten



Preis: 11,98 €

Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	30 ct
Form	Tabletten
Inhalt	30 Tabletten
Kategorie	Pflanzliche Medikation
Marke Hersteller	WROCLAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Merkmale Raphacholin Forte ist ein Arzneimittel in Form von Filmtabletten zur Anwendung bei unzureichender Gallensekretion der Leber und Verdauungsstörungen, die sich durch Blähungen, Bauchschmerzen, Aufstoßen, Übelkeit, Verstopfung und als mildes Abführmittel äußern. **Zusammensetzung** Der Wirkstoff des Arzneimittels ist Dehydrocholsäure (Acidum dehydrocholicum). 1 Filmtablette enthält 250 mg Dehydrocholsäure (Acidum dehydrocholicum). Hilfsstoffe: Schwarzer Rettichwurzel-Trockenextrakt (10-15:1) [nativer Extrakt (20-30:1) 50 %, Maltodextrin 50 %, Extraktionsmittel - Wasser] Ätherisches Pfefferminzöl, mikrokristalline Cellulose, Carboxymethylstärke-Natrium, Kartoffelstärke, Povidon, kolloidales Siliciumdioxid wasserfrei, Talkum, Natriumlaurylsulfat, Aktivkohle, Aqua Polish black 081 Überzug.06 bestehend aus Hypromellose, Lactose-Monohydrat, Talkum, Macrogol, Eisenoxidschwarz (E 172), Indigotin (E 132). **Dosierung** Dieses Arzneimittel sollte immer genau nach der Anweisung in der Packungsbeilage oder nach Anweisung des Arztes oder Apothekers eingenommen werden. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt oder Apotheker. **Wirkung** Raphacholin Forte erhöht das Volumen der ausgeschiedenen Galle (choleretisch) und beschleunigt deren Transport zum Zwölffingerdarm. Die erhöhte Gallenmenge regt die Arbeit des Dickdarms an, so dass das Präparat leicht abführend wirkt. **Indikationen** Raphacholin Forte wird traditionell bei Verdauungsstörungen, Verdauungsbeschwerden im Zusammenhang mit Leberfunktionsstörungen (Blähungen, Bauchschmerzen, Aufstoßen, Übelkeit, Verstopfung), bei unzureichender Gallensekretion durch die Leber eingesetzt. **Kontraindikationen** Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich gegen den Wirkstoff oder einen der Hilfsstoffe sind. Das Arzneimittel sollte nicht bei akuten und chronischen Lebererkrankungen, akuten entzündlichen Zuständen im Magen-Darm-Trakt, Gallenwegsobstruktion und Magen-Darm-Traktobstruktion angewendet werden.