


Raphacholin C HERBAPOL WROCLAW 30 Tabletten

Preis: 5,68 €



Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	30 ct
Form	Tabletten
Inhalt	30 Tabletten
Kategorie	Nahrungsergänzungsmittel
Marke Hersteller	WROCLAWSKIE ZAKLADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Zusammensetzung Wirkstoff: 1 Drachme zu 600 mg enthält die Wirkstoffe: Raphani sat. nigri extr. sicc. cum Carbo medicinalis (1:1) 150,0 mg, Cynarae herbae extr. spissum 47,0 mg, Menthae pip. oleum 15,0 mg. Hilfsstoffe: Kartoffelstärke, Saccharose, Gelatine, Aerosil, Magnesiumstearat, Talkum, Gummi arabicum, Calciumhydrogenphosphat, medizinische Kohle. **Indikationen** Das Arzneimittel wird angewendet bei Gallenblasenatonie, bei Verdauungsstörungen (insbesondere bei Gallengangsdyskinesie, Blähungen, Verstopfung), unterstützend bei Entzündungen der Gallenwege und der Gallenblase. Bei Cholelithiasis sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit einem Arzt angewendet werden. **Wirkung** Raphacholin C ist ein cholepoetisches und choleretisches Arzneimittel (wirkt direkt auf die Leber und stimuliert die Gallensekretion). Es enthält in seiner Zusammensetzung Trockenextrakt aus schwarzem Rettich mit medizinischer Kohle, Trockenextrakt aus Artischocke, Dehydrocholsäure und Minzöl. Die regelmäßige Einnahme des Präparats regt die Gallensekretion an, was sich schützend auf das Leberparenchym auswirkt, die Ausscheidung von Schadstoffen mit der Galle beschleunigt und die peristaltischen Bewegungen des Darms fördert. Raphacholin C wird bei Verdauungsstörungen und Verdauungsbeschwerden (Übelkeit, Bauchschmerzen, Aufstoßen, Blähungen, Verstopfung) eingesetzt, die vor allem durch Störungen der Kontraktionsfähigkeit der Gallenwege verursacht werden. In Absprache mit einem Arzt wird das Präparat als Hilfsmittel bei chronischen Entzündungen der Gallenwege eingesetzt. **Dosierung** Erwachsene 3 mal täglich 1 bis 2 Drachmen nach dem Essen. Bei Verstopfung 2 Drachmen morgens und abends 1/2 Stunde vor dem Essen. In begründeten Fällen bei Kindern über 12 Jahren 3-mal täglich 1 Drachme nach den Mahlzeiten einnehmen. **Kontraindikationen** Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des Arzneimittels, schweren Lebererkrankungen, Gallen- und Magen-Darm-Verschluss, akuten und chronischen Magen- und Darmentzündungen. Die Sicherheit des Arzneimittels ist bei schwangeren und stillenden Frauen nicht untersucht worden, daher ist es nicht empfehlenswert, das Präparat ohne Rücksprache mit einem Arzt zu verwenden. **Informationen** Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage, die Angaben zu Indikationen, Gegenanzeigen, Nebenwirkungen und Dosierung sowie Informationen zur Anwendung und Lagerung des Arzneimittels enthält, oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, da jede unsachgemäße Anwendung des Arzneimittels Ihr Leben oder Ihre Gesundheit gefährdet.