

Raphacholin Forte HERBAPOL WROCLAW 10 Tabletten

Preis: 5,33 €



Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	10 ct
Form	Filmtabletten
Inhalt	10 Tabletten
Kategorie	Nahrungsergänzungsmittel
Marke Hersteller	WROCLAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Zusammensetzung Wirkstoff Dehydrocholsäure (acidum dehydrocholicum) - 250 mg. Hilfsstoffe: trockenextrakt aus schwarzer Rettichwurzel (10-15:1): [nativer Extrakt (20-30:1) 50%, Maltodextrin 50%, Extraktionsmittel - Wasser] minzöl mikrokristalline Cellulose, Carboxymethylstärke-Natrium, Kartoffelstärke, Povidon, kolloidales Siliciumdioxid wasserfrei, Talkum, Natriumlaurylsulfat, Aktivkohle, Aqua Polish black 081.06 Überzug bestehend aus Hypromellose, Lactose-Monohydrat, Talkum, Macrogol, Eisenoxid schwarz (E 172), Indigotin (E 132). **Wirkung** Rapacholin Forte ist ein Arzneimittel, das eine Zusammensetzung aus Dehydrocholsäure mit dem Zusatz von schwarzem Rettich-Extrakt enthält, mit der Wirkung, das Volumen der ausgeschiedenen Galle zu erhöhen (choloretisch) und ihren Transport zum Zwölffingerdarm zu beschleunigen. Das erhöhte Volumen der Galle stimuliert den Dickdarm und hat auch eine osmotische Wirkung, so dass das Produkt eine leicht abführende Wirkung hat. **Indikationen** Das Arzneimittel wird angewendet bei ungenügender Gallensekretion der Leber und bei Verdauungsstörungen, die sich durch Blähungen, Übelkeit, Bauchschmerzen, Aufstoßen, Verstopfung oder als mildes Abführmittel äußern. **Dosierung** Bei Verdauungsstörungen: Erwachsene oral 1 Tablette nach dem Essen, bei Bedarf kann die Dosis auf 3 Tabletten täglich erhöht werden. bei Verstopfung: Erwachsene 2 Tabletten auf einmal. Eine abführende Wirkung ist für bis zu 6 Stunden zu erwarten. **Kontraindikationen** Folgende Kontraindikationen für die Anwendung des Arzneimittels sind zu beachten: akute und chronische Lebererkrankungen, akute Entzündungen im Magen-Darm-Trakt, Obstruktion der Gallenwege und des Magen-Darm-Trakts. Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des Arzneimittels. **Nebenwirkungen** Durchfall, Übelkeit, Erbrechen und andere gastrointestinale Beschwerden können auftreten. **Bemerkungen** Bei Cholelithiasis oder Choledocholithiasis das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden. Bei Verstopfung nehmen Sie das Medikament ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt nicht länger als eine Woche ein. Überschreiten Sie die Dosis von 6 Tabletten nicht. Wenden Sie das Medikament nicht bei Kindern, während der Schwangerschaft und in der Stillzeit an. Es wurde kein Einfluss des Arzneimittels Rapacholin Forte auf die Fähigkeit, Fahrzeuge zu führen und bewegliche Mechanismen zu bedienen, festgestellt. Bewahren Sie das Arzneimittel außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern auf.