


## SENTINO 12,5 mg 14 Tabletten



Preis: 7,87 €

## Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	14 ct
Form	Filmtabletten
Inhalt	14 Tabletten
Kategorie	Arzneimittel
Marke Hersteller	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Versand	in 24h

## Produktbeschreibung

**Merkmale** Sentino ist ein Arzneimittel, das den Wirkstoff Doxylaminhydrogensuccinat enthält. Doxylamin gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln mit schlaf- und beruhigender Wirkung. Das Arzneimittel ist für Erwachsene bestimmt. **Zusammensetzung** Der Wirkstoff ist Doxylaminhydrogensuccinat (Doxylamini hydrogensuccinas). Jede Tablette enthält 12,5 mg Doxylaminhydrogensuccinat. Hilfsstoffe: Calciumhydrogenphosphat-Dihydrat; mikrokristalline Cellulose; Natriumcarboxymethylstärke (Typ A); kolloidale Kieselsäure wasserfrei; Magnesiumstearat. Überzug (OPADRY II Complete Film Coating System 57U35237 Red): Hypromellose (15 mPas); Polydextrose; Talkum; Titandioxid (E 171); Maltodextrin; mittelkettige Fettsäuretriglyceride; Cochenillerot, lac (E 124); Sunset Yellow, lac (E 110); Chinolingelb, lac (E 104). **Dosierung** Dieses Arzneimittel sollte immer genau wie in der Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers angewendet werden. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Erwachsene (ab 18 Jahren): die empfohlene Anfangsdosis beträgt 12,5 mg, die 30 Minuten vor dem Schlafengehen eingenommen wird. Die Dosis kann auf 25 mg erhöht werden, wenn die Anfangsdosis keine ausreichende Linderung der Schlaflosigkeitssymptome bewirkt. Die maximale Tagesdosis sollte 25 mg (2 Tabletten) pro Tag nicht überschreiten. Das Arzneimittel sollte oral eingenommen werden. Die Tabletten sollten 30 Minuten vor dem Schlafengehen mit ausreichend Flüssigkeit (vorzugsweise Wasser) eingenommen werden. Sentino kann mit oder nach dem Essen eingenommen werden. Das Präparat sollte ohne Rücksprache mit dem Arzt nicht länger als 7 Tage eingenommen werden. **Anwendungsgebiete** Das Arzneimittel wird zur kurzfristigen, symptomatischen Behandlung von gelegentlicher Schlaflosigkeit bei Erwachsenen eingesetzt, insbesondere bei: Schwierigkeiten beim Einschlafen, häufigem nächtlichen Erwachen, frühmorgendlichem Aufwachen im Zusammenhang mit Stress oder Zeitzonewechsel. **Kontraindikationen** Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Doxylamin oder einen der sonstigen Bestandteile des Präparates und andere Antihistaminika. Die Anwendung ist kontraindiziert bei: Asthma, chronischer Bronchitis (anhaltender Husten mit Auswurf von Sekret und Schleim) oder Emphysem (Atembeschwerden); Glaukom (erhöhter Augendruck); Prostatavergrößerung; behindertem Harnabfluss aus der Blase; Magen-Darm-Stenose aufgrund von Magengeschwüren oder Pyloroduodenalstenose; schwerer Nieren- und Leberfunktionsstörung. **Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen** Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen Bei leichter bis mittelschwerer Leber- und Nierenfunktionsstörung, Epilepsie, niedrigem Kaliumspiegel, EKG-QT-Verlängerung, Herzerkrankungen und Harnverhalt ist Vorsicht geboten und ein Arzt zu konsultieren. Sentino kann die Symptome von Dehydrierung und Hitzschlag durch vermindertes Schwitzen, insbesondere bei heißem Wetter, verschlimmern. Trinken Sie während der Behandlung keinen Alkohol. Bewahren Sie das Arzneimittel außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern auf.