

Rutinoscorbin 150 Tabletten



Preis: 6,58 €

Beschreibung im Wörterbuch

Einheitspreis	150 ct
Form	Tabletten
Inhalt	150 Tabletten
Kategorie	Nahrungsergänzungsmittel
Marke Hersteller	GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A.
Versand	in 24h

Produktbeschreibung

Merkmale

Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg ist ein Arzneimittel in Form von Filmtabletten, das die Wirkung von Rutosid und Vitamin C (Ascorbinsäure) kombiniert. Rutosid verringert die Durchlässigkeit der Blutgefäße und stärkt sie. Vitamin C ist für viele Stoffwechselfvorgänge unerlässlich. Es ist an der Bildung von Kollagen und Hämoglobin beteiligt, erleichtert die Aufnahme von Eisen und hat eine antioxidative Wirkung. Das im Präparat enthaltene Rutosid schützt das Vitamin C vor Oxidation. Dadurch behält es seine Eigenschaften länger bei.

Anwendungsgebiete

Bei Mangelzuständen und erhöhtem Bedarf an Vitamin C (Erkältungen, Virusinfektionen, einschließlich Grippe) und als Hilfsmittel bei übermäßiger Gefäßdurchlässigkeit.

Zusammensetzung

1 Tablette enthält:

Wirkstoffe: 25 mg Rutosid, 100 mg Ascorbinsäure, Hilfsstoffe: Lactose-Monohydrat, Kartoffelstärke, Saccharose, Polyvinylalkohol, Talk, Magnesiumstearat. Der Tablettenumschlag besteht aus: Opadry II 85F32876 Gelb (Polyvinylalkohol, Macrogol 4000, Titandioxid (E171), Talk, Chinolingelb-Aluminiumlack).

Wirkungsweise

Antioxidans, das die Blutgefäße stärkt und ihre Durchlässigkeit verringert.

Dosierung

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in der Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt oder Apotheker.

Das Arzneimittel wird oral eingenommen. Die empfohlene Dosis beträgt:

prophylaktisch: 1 bis 2 Tabletten pro Tag.

bei Vitamin-C-Mangelzuständen: 1 bis 2 Tabletten 2 bis 4 mal pro Tag.

Kinder unter 6 Jahren: das Arzneimittel Rutinoscorbin sollte nach Anweisung des Arztes angewendet werden.

Patienten mit Nierenerkrankungen: sollten nicht mehr als 5 Tabletten pro Tag (entsprechend 500 mg Vitamin C) einnehmen.

Dosierungen, die höher als empfohlen sind, sollten nicht verwendet werden. Wenn Sie mehr als die empfohlene Dosis einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Bei sehr hohen Dosen kann es zu Durchfall kommen, es besteht die Gefahr einer Hämolyse (Abbau roter Blutkörperchen), von Nierensteinen, Wasser-Elektrolyt-Störungen und einer erheblichen Beeinträchtigung des Cobalamins (Vitamin B12). Verwenden Sie nicht die doppelte Dosis, um eine vergessene Dosis auszugleichen.

Kontraindikationen

Rutinoscorbin darf nicht angewendet werden, wenn der Patient:

Überempfindlichkeit gegen Rutosid und Ascorbinsäure (Vitamin C) oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels;

- Oxalatstonose (eine Krankheit, bei der sich Ablagerungen, sogenannte "Steine", in den Nieren bilden) oder in der Vergangenheit hatte;
- Krankheiten, die mit einer übermäßigen Eisenanreicherung einhergehen (Thalassämie, Hämochromatose, sideroblastische Anämie) oder andere Krankheiten, die einen Eisenüberschuss im Körper verursachen können.